



Ischemische hartziekten: bewust niet uitgewerkt, geen actie nodig

7418

Hieronder zijn de geneesmiddel(groep)en opgenomen waarvoor de beschikbare informatie erop wijst dat wel sprake is van een contra-indicatie, maar er geen actie nodig is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van geprotocolleerde zorg.

Geneesmiddel(groep)	Toelichting	Datum uitgewerkt	Datum akkoord werkgroep
Angiotensine II	Aanleiding: SmPC Giapreza Rubriek 4.4 Perifere ischemie Er is melding gemaakt van perifere ischemie bij gebruik van angiotensine II (zie rubriek 4.8). Het is belangrijk GIAPREZA toe te dienen in de laagste compatibele dosis om een adequate gemiddelde arteriële druk en weefselperfusie te bereiken of te handhaven. Rubriek 4.8 Perifere ischemie In de GIAPREZA-arm ervoeren meer patiënten perifere ischemie dan in de placeboarm (7 [4,3%] tegenover 4 [2,5%]). Daarvan werden 5 gevallen (3,1%) in de GIAPREZA-arm en 3 gevallen (1,9%) in de placeboarm als ernstig beschouwd. In elke arm werd bij één patiënt de behandeling als gevolg daarvan beëindigd. Perifere ischemie kan een gevolg zijn van het werkingsmechanisme van GIAPREZA. Het is belangrijk GIAPREZA toe te dienen in de laagste compatibele dosis om een adequate gemiddelde arteriële druk en weefselperfusie te bereiken of te handhaven. Om bijwerkingen als gevolg van langdurige vasoconstrictie tot een minimum te beperken, moet de behandeling worden stopgezet zodra de onderliggende shock voldoende is verbeterd (zie rubriek 4.2 en 4.4). Conclusie: Bewust niet uitwerken (J/N).	12-05-2021	25-10-2021

	Angiotensine II wordt geprotocolleerd toegepast. Daarom wordt deze bewaking bewust niet uitgewerkt.		
--	---	--	--