

Afkorting:

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 15 november 2021

CONCLUSIE

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft alectinib ingedeeld in categorie I op basis van de beschikbare literatuur. Alectinib kan invloed hebben op de rijvaardigheid.

OVERWEGINGEN EN AANVULLENDE OPMERKINGEN

Alectinib passeert de bloed-hersenbarrière, hierdoor kan alectinib invloed hebben op de rijvaardigheid. Dit in combinatie met de symptomatische bradycardie (bijv. duizeligheid, hypotensie) die zeer vaak gemeld is heeft ertoe geleidt dat alectinib in categorie I is ingedeeld.

DRUID classificatiesysteem:

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive). [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.]
- category I (minor influence on fitness to drive). [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category II (moderate influence on fitness to drive). [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category III (severe influence on fitness to drive). [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

STUDIES

Bron	Bewijs	Resultaten/ opmerkingen
-	-	-

Classificaties

Bron	Resultaten/ opmerkingen
DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 4.4.1 (21-07-2011)	DRUID heeft alectinib niet ingedeeld.

SPC

Bron	Resultaten/ opmerkingen
SPC Alecensa (tabletten)– 01 december 2017	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Alecensa heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Voorzichtigheid is geboden bij het rijden of het bedienen van machines, omdat patiënten symptomatische bradycardie (bijv. syncope, duizeligheid, hypotensie) of visusstoornissen kunnen ervaren tijdens gebruik van Alecensa (zie rubriek 4.8). 4.8 Bijwerkingen Zeer vaak (≥ 1/10): Visusstoornissen (wazig zien, slechter zien, mouches volantes, verminderde gezichtsscherpte, asthenopie, dubbelzien, fotofobie en fotopsie) Zeer vaak (≥ 1/10): Bradycardie (bijv. syncope, duizeligheid, hypotensie)

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing	Ja	Ja	I	21 januari 2022