

Verkeersdeelname: Proteasoomremmers (bortezomib, carfilzomib en ixazomib)



7500

Afkorting:

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 29 november 2021

CONCLUSIE

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft de proteasoomremmers ingedeeld in categorie I op basis van de beschikbare literatuur. Proteasoomremmers kunnen door de bijwerkingen invloed hebben op de rijvaardigheid.

OVERWEGINGEN EN AANVULLENDE OPMERKINGEN

Gebruik van proteasoomremmers kan zorgen voor bijwerkingen zoals duizeligheid en vermoeidheid. Dit heeft ertoe geleid dat de proteasoomremmers in categorie I zijn ingedeeld.

DRUID classificatiesysteem:

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive). [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.]
- category I (minor influence on fitness to drive). [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category II (moderate influence on fitness to drive). [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category III (severe influence on fitness to drive). [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

STUDIES

Bron	Bewijs	Resultaten/ opmerkingen
-	-	-

Classificaties

Bron	Resultaten/ opmerkingen
DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co- ordination and synthesis report. 4.4.1 (21-07-2011)	DRUID heeft bortezomib, carfilzomib en ixazomib niet ingedeeld.

SPC

Bron	Resultaten/ opmerkingen
SPC Bortezomib SUN (Injectie)– 22 juni 2021	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Bortezomib kan matige invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bortezomib kan geassocieerd worden met vermoeidheid (zeer vaak), duizeligheid (vaak), syncope (soms) en orthostatische/houdingsafhankelijke hypotensie (vaak) of wazig zien (vaak). Daarom moeten patiënten voorzichtig zijn als ze een auto besturen of machines gebruiken en moet hen worden afgeraden een auto te besturen of machines te bedienen als ze last hebben van deze symptomen (zie rubriek 4.8). 4.8 Bijwerkingen Vaak ($\geq 1/100$, $< 1/10$): duizeligheid, wazig zien en orthostatische/houdingsafhankelijke hypotensie Zeer vaak ($\geq 1/10$): Vermoeidheid
SPC NINLARO (oraal)– 20 november 2020	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Ixazomib heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Bij klinische studies zijn vermoeidheid en duizeligheid waargenomen. Patiënten moet worden geadviseerd niet te rijden en geen machines te bedienen als ze deze symptomen ervaren. 4.8 Bijwerkingen Vaak ($\geq 1/100$, $< 1/10$): vermoeidheid Onbekend: duizeligheid
SPC Kyprolis (infusie)– 25 juni 2020	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Kyprolis heeft geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. In klinische onderzoeken zijn vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen, wazig zien, slaperigheid en/of een daling van de bloeddruk waargenomen. Patiënten die met Kyprolis worden behandeld, moeten het advies krijgen om niet te rijden en geen machines te bedienen als ze een van deze symptomen ervaren. 4.8 Bijwerkingen Vaak ($\geq 1/100$, $< 1/10$): wazig zien en hypotensie Zeer vaak ($\geq 1/10$): vermoeidheid en duizeligheid

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing	Onbekend	Ja	I*	21 januari 2022