

Ozanimod + Betablokkers/Diltiazem

7936

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
-			

Overig	Stof	Effect
SPC Zeposia	ozanimod + propranolol / diltiazem	geen aanvullende klinisch relevante veranderingen hartfrequentie of PQ-tijd bij combinatie ozanimod met propranolol of diltiazem. Regime: ozanimod 0.23 mg eenmalig icm propranolol 80 mg 1 dd of diltiazem 240 mg 1 dd bij steady state in vergelijking met propranolol of diltiazem alleen; studie onder gezonde personen. Advies: vanwege risico op additieve effecten op verlaging van de hartfrequentie voorzichtig bij instellen ozanimod bij patiënten met bètablokker of calciumkanaalblokker (bijv. diltiazem). Behandeling met bètablokkers en calciumkanaalblokkers kan worden ingesteld bij patiënten met stabiele doses ozanimod.
SPC Zeposia	ozanimod	starten met ozanimod kan tot tijdelijke verlagingen van de hartfrequentie leiden. Daarom schema voor initiële dosisverhoging volgen. Na toediening startdosis 0.23 mg ozanimod begon de hartfrequentie te dalen in uur 4. De grootste gemiddelde daling vond plaats in uur 5 en de uitgangswaarde werd opnieuw benaderd in uur 6. Bij voortzetting van de dosisverhoging waren er geen klinisch relevante verlagingen van de hartfrequentie.

Opmerkingen

Pubmed, Stockley: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Nee	Nee	7 februari 2022