

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Tran JQ. Adv Ther 2020;37:4381-95. doi: 10.1007/s12325-020-01473-0. Trial registration: Clinical trial: NCT03624959.	ozanimod + itraconazol	↑AUC ozanimod 1.13x en Cmax ongewijzigd; ↓Cmax actieve metabolieten met 22% en geen effect op AUC. Regime: ozanimod 0.92 mg 1-malig, alleen of icm itraconazol 200 mg 1dd (op dag 4 van 17 dagen); studie met 2x 20 vrijwilligers. Auteurs: these modest changes indicate a minor role of CYP3A4 and P-gp in the overall disposition of ozanimod.	3A

Overig	Stof	Effect
SPC Zeposia	ozanimod + itraconazol	itraconazol niet genoemd. bijwerkingen (>10%): nasofaryngitis, lymfopenie. bijwerkingen (1-10%): faryngitis, luchtweginfectie viraal, urineweginfectie, bradycardie, hypertensie, orthostatische hypotensie; ALAT, γ-GT en bloedbilirubine verhoogd. GIC: geen onderzoeksgegevens gevonden van gevolgen bij doseringen hoger dan de aanbevolen dosis.

Opmerkingen

Werkgroep Interacties: actie Nee, effecten zijn klein en vermoedelijk klinisch niet relevant.

Pubmed, Stockley: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Nee	7 februari 2022