

Dialyse hemodialyse: lamivudine+overig

7545

Clcr = creatinineklaring

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Dovato 24-03-2022	Clcr < 30 ml/min: gebruik niet aanbevolen Lamivudine: kan gedialyseerd worden. Dolutegravir: bindt zich sterk aan plasma-eiwitten. Het is niet waarschijnlijk dat het significant zal worden verwijderd door dialyse.
SPC Kivexa 07-01-2022	Clcr < 30 ml/min: gebruik niet aanbevolen Lamivudine: kan gedialyseerd worden. Abacavir: het is niet bekend of abacavir verwijderd kan worden via hemodialyse.
SPC Trizivir 12-01-2022	Clcr ≤ 30 ml/min: abacavir, lamivudine en zidovudine als afzonderlijke geneesmiddelen toedienen. Terminale nierinsufficiëntie: gebruik gecontra-indiceerd. Lamivudine: kan gedialyseerd worden. Zidovudine: hemodialyse en peritoneale dialyse blijken op de eliminatie van zidovudine een beperkt effect te hebben, maar bevorderen wel de eliminatie van de glucuronidemetaboliet. Abacavir: het is niet bekend of abacavir verwijderd kan worden via hemodialyse.
SPC Triumeq 24-03-2022	Clcr < 30 ml/min: gebruik niet aanbevolen Lamivudine: kan gedialyseerd worden. Abacavir: het is niet bekend of abacavir verwijderd kan worden via hemodialyse. Dolutegravir: bindt zich sterk aan plasma-eiwitten. Het is niet waarschijnlijk dat het significant zal worden verwijderd door dialyse.
SPC Combivir 07-01-2022	Clcr ≤ 30 ml/min: lamivudine en zidovudine als afzonderlijke geneesmiddelen toedienen. Lamivudine: kan gedialyseerd worden. Zidovudine: hemodialyse blijkt op de eliminatie van zidovudine een beperkt effect te hebben, maar bevordert wel de eliminatie van de glucuronidemetaboliet.

Opmerkingen:

- Pubmed search 02-05-2022: geen resultaat
- Zie risicoanalyse bewaking Dialyse hemodialyse: lamivudine voor de onderbouwing voor dosisaanpassing van lamivudine.

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Lamivudine: Intermitterend = nee Continu = ja Overig: onbekend	Ja	13 juni 2022