

Dialyse hemodialyse: lamivudine + doravirine + tenofovir disoproxil

7548

Clcr = creatinineklaring, GFR = glomerulaire filtratie snelheid

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Delstrigo 12-04-2022	0	<u>Lamivudine</u> hemodialyse, continue ambulante peritoneale dialyse en automatische peritoneale dialyse: een verwaarloosbare hoeveelheid lamivudine werd verwijderd. <u>Tenofovirdisoproxil</u> Tenofovirdisoproxil wordt op een efficiënte manier verwijderd door hemodialyse met een extractiecoëfficiënt van ongeveer 54 %. Na een enkelvoudige dosis van 245 mg tenofovirdisoproxil wordt ongeveer 10 % van de toegediende dosis tenofovir verwijderd door een 4 uur durende hemodialysesessie. <u>Doravirine</u> is niet bestudeerd bij patiënten met terminaal nierfalen of bij dialysepatiënten.	Crcl < 50 ml/min: geen behandeling starten. Behandeling staken indien de geschatte CrCl tot onder de 50 ml/min daalt.

Overig	Opmerkingen

Opmerkingen:

- Pubmed search 04-05-2022: geen resultaat
- Zie risicoanalyses bewaking Dialyse hemodialyse: lamivudine en Dialyse hemodialyse: tenofovir disoproxil voor de onderbouwing voor dosisaanpassing van lamivudine en tenofovir disoproxil.

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Lamivudine en tenofovir disoproxil: Intermitterend = Nee Continu = Ja Doravirine: onbekend	Ja	13 juni 2022