

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
Lee TH. Am Heart J 1985;109:163-4.	amiodaron + diltiazem i.v.	vrouw (68): sinus arrest, lage cardiac output, oligurie 4 dagen na start amiodaron 600 mg 2dd en 8 dagen na start oraal diltiazem 90 mg 4dd. Beiden gestaakt. Na 1 week geslaagde herstart amiodaron, furosemide. → Projectgroep: dubieuze casus, dit kan optreden zonder interactie; op de 2 middelen apart gaat goed.
Marcus FI. Am Heart J 1983;106:924-30.	amiodaron + calciumantagonist	theoretische voorspelling over disfunctie van de sinusknoop zoals bradycardie, of sick sinus syndroom bij combinatie van amiodaron met verapamil of diltiazem. Geen interactiestudie.

Opmerkingen

Projectgroep: 2x dezelfde bijwerkingen (farmacodynamische interactie). De voorschrijver hoort dit te weten. Is meer dubbelmedicatie. Beoordeeld als "NeeJa" en per oktober 2007 als zodanig in het bestand ingevoerd (tot oktober 2007 ingevuld als "JaJa". Controle ECG.

SPC diltiazem iv: amiodaron is gecontraïndiceerd;

SPC oraal diltiazem: met andere antiaritmica (zoals amiodaron) is potentiering van het remmend effect op de hartfrequentie en het vertragend effect op de AV-geleiding mogelijk;

spc amiodaron: gelijktijdig verapamil/diltiazem niet aanbevolen.

Geen meldingen met verapamil, hooguit 1 niet-gespecificeerd geval van aritmie, anorexie, digoxine-toxiciteit (8.4 nmol/l) bij combinatie amiodaron+verapamil+digoxine (Larmour I ea. A prospective study of Hospital admissions due to drug reactions. Aust J Hosp Pharm 1991;21:90-5).

Verder geen meldingen met amiodaron.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Nee	Ja	4 februari 2003