

Cyproheptadine + SSRI's

MFB 8070

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Feder R. J Clin Psychiatry 1991;52:163-4.	fluoxetine	- dysforie binnen 3 uur na start cyproheptadine; na nogmaals 3 dagelijkse doses terugkeer depressieve klachten bij man die sinds 18 dagen fluoxetine gebruikte. 4 dagen na staken cyproheptadine afname depressieve klachten; - terugkeer depressieve klachten 2 dagen na start cyprohept 6 mg/dag (in 1 week verhoogd van 2 naar 6 mg/dag), bij man die sinds 4 weken fluoxetine gebruikte. 4 dagen na staken cyproheptadine afname klachten; - ernstige dysforie binnen 4 uur na cyprohept. 2 mg, bij man die sinds 10 dagen fluoxetine 80 mg/dag gebruikte. Klacht hield 36 uur aan en trad weer op bij 2 herhaalde doses cyproheptad. met 1 week interval.	1C 1C 2C
Goldbloom DS. J Clin Psychiatry 1991;52:261-2.	fluoxetine	terugkeer vreetbuien enkele dagen na start cyprohept. bij 2 vrouwen met boulemie in remissie door fluoxetine. In 1 geval werd de fluoxetine-dosering verhoogd, zonder effect. Klachten verdwenen bij beiden 3-7 dagen na staken cyprohept.	1C
Katz RJ. J Clin Psychiatry 1994;55:314-5.	fluoxetine	irritatie, dysforie en zelfmoordgedachten binnen 36 uur na start cyprohept. (totaal 4x 4 mg) bij depressieve vrouw, sinds 6 maanden stabiel met fluoxetine. 5 dagen na staken cyprohept. waren klachten verdwenen. Na rechallenge (totaal 2x 4 mg) weer depressieve klachten maar geen zelfmoordgedachten. 3 dagen na staken cyprohept waren klachten verdwenen.	2C
Christensen RC. J Clin Psychiatry 1995;56:433-4.	paroxetine	depressie, zelfmoordgedachten en paranoïde wanen binnen 2-4 dagen na start cyprohept. 2 mg 2dd bij vrouw met niet-psychotische major depressie goed reagerend op paroxetine. Klachten verdwenen 2 dagen na staken cyprohept.	1C

Overig	Stof	Effect
McCormick S. J Clin Psychiatry 1990;51:383-4.	fluoxetine	geen exacerbatie van depressieve klachten bij 2 mannen die werden behandeld met fluoxetine en die cyproheptadine 8-16 mg/dag gebruikten vanwege door fluoxetine veroorzaakte anorgasmie.

Opmerkingen:

WFG 24-6-03: therapiefalen SSRI's = C. Alle SSRI's koppelen op basis van analogie. Bij voorkeur cyproheptadine vervangen. Als dit niet mogelijk is zo nodig dosering SSRI aanpassen op geleide van effect. Vertel patiënt over mogelijke gevolgen

Mechanisme: cyproheptadine is een 5HT-antagonist, kan theoretisch SSRI's tegenwerken.

SPC Cyproheptadine: geneesmiddelen met serotonineremmende activiteit, zoals cyproheptadine, kunnen werking serotonineverhogende antidepressiva beïnvloeden

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	24 juni 2003