

Bariatrische chirurgie: orale anticonceptiva (noodanticonceptie)

7667

Afkortingen

-

CONCLUSIE

Er zijn geen gegevens over de betrouwbaarheid van orale noodanticonceptie na bariatrische chirurgie. Op basis van theoretische gronde is het mogelijk dat de absorptie van orale noodanticonceptie, net zoals bij combinatiepreparaten en mono-progestagenen, verminderd is na een dergelijke operatie. Een koperspiraal is een betrouwbaar alternatief. Het is belangrijk dat de patiënt hierover geïnformeerd wordt.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Er zijn geen studies gedaan naar de toepassing en effectiviteit van orale noodanticonceptie na bariatrische chirurgie. Op basis van theoretische gronde is het mogelijk dat de absorptie van orale noodanticonceptie, net zoals bij combinatiepreparaten en mono-progestagenen, verminderd is na een dergelijke operatie.

Als noodanticonceptie is de koperspiraal (plaatsing binnen 120 uur na onbeschermdde gemeenschap) effectief. Indien er wordt gekozen voor een koperspiraal dan kan deze in de baarmoeder blijven en als anticonceptivum worden gebruikt of worden verwijderd bij de eerstvolgende menstruatie.

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg	Belangrijkste resultaten	Opmerkingen KNMP
-	-	-	-	-

Overig	BMI / kg	Belangrijkste resultaten	Opmerkingen KNMP
Ostrowska et al. The use of contraception for patients after bariatric surgery. Ginekologia Polska. 2016; 87 (8): 591-593. Review		In deze review wordt vermeld dat orale noodanticonceptie niet aanbevolen worden bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan, met name bariatrische chirurgie van het malabsorptieve type.	Geen bronnen

	Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Ja	19-09-2022