



Mastocytose/Mestcelactivatiesyndroom: bewust niet uitgewerkt

7715

In dit document staan nog niet uitgewerkte contra-indicatiebewakingen waarvoor de gevonden informatie wijst op een nee/nee-bewaking. Voor deze contra-indicatiebewakingen is informatie gezocht n.a.v. aanmelding van nieuwe geneesmiddelenproducten voor de G-Standaard, meldingen vanuit de praktijk, informatie uit nieuwe literatuur of uit bijgewerkte SmPC's. Of er is informatie gezocht bij het updaten van een oudere contra-indicatie. Deze contra-indicatiebewakingen werken we NIET uit. Ze zullen dan ook niet worden opgenomen in de G-Standaard en Health Base Medicatiebewaking.

Geneesmiddel(groep)	Toelichting	Datum uitgewerkt	Datum akkoord werkgroep
Vaccins	Aanleiding: Richtlijn <i>Mastocytose</i> Federatie Medisch Specialisten 2022 Vaccineer kinderen met mastocytose zoals gebruikelijk tenzij er mogelijk een verhoogd risico is, bijvoorbeeld omdat het kind een eerdere reactie op een vaccin heeft gehad. Verwijs het kind in dat geval naar een expertisecentrum voor consultatie en een vaccinatie advies. <u>Vaccinatie bij kinderen</u> Er is maar één studie gevonden over het risico op anafylaxie bij kinderen met mastocytose waarin gerapporteerd wordt dat het risico erg klein is. Experts in de werkgroep benoemen dat het risico op anafylaxie eerder is geassocieerd met het rabiës vaccin. Op basis van klinische ervaring achten zij het risico ook hoger wanneer polyvalente vaccins gebruikt worden. Experts uit de werkgroep zien in de praktijk over het algemeen geen problemen met vaccineren. Bij zuigelingen met DCM of met uitgebreide MPCM, is het risico op een reactie waarschijnlijk iets hoger en valt klinisch vaccineren te overwegen. Experts zijn van mening dat wanneer een verhoogd risico op reactie na vaccinatie wordt vermoed bij een kind, verwijzing of consultatie naar een expertisecentrum gepast is. Pubmed/Embase: (mastocytos*[Title/Abstract]) AND (vaccin*[Title/Abstract]) Geen (relevante) hits	6-12-2022	4-4-2023

	Conclusie: Er is weinig bewijs. Het risico op anafylaxie na vaccinatie is bij patiënten met mastocytose niet hoger/anders dan bij gezonde kinderen. Vaccins zijn daarom niet gecontra-indiceerd bij patiënten met mastocytose.		
Röntgencontrastmiddelen	Aanleiding: Richtlijn <i>Mastocytose</i> Federatie Medisch Specialisten 2022 Standaard toepassing van profylaxe voor anafylaxie is niet nodig voor toediening van ... röntgen contrast media aangezien het risico op een reactie over de gehele patiëntengroep genomen laag is. <u>Röntgencontrastmedia</u> Hermans et al. (2017) hebben in een systematische review onder andere het aantal ongewenste bijwerkingen op röntgencontrastmedia geëvalueerd. Bij (n = 457) patiënten uit vier studies werden (n = 3) gevallen van anafylaxie gezien. In drie studies (n = 383) werden ook milde reacties op röntgencontrastmedia geregistreerd, dit kwam één keer voor. Pubmed/Embase: (mastocytos*[Title/Abstract]) AND (x-ray[Title/Abstract] OR contrast agent[Title/Abstract]) Retrospectieve chart-review laat zien dat hypersensitiviteitsreacties op contrastmedia zeldzaam zijn en dat premedicatie bij patiënten met mastocytose die niet eerder een reactie op contrastmedia gehad hebben niet nodig is. [Schwaab et al. <i>Low risk of contrast media-induced hypersensitivity reactions in all subtypes of systemic mastocytosis</i>. Ann Allergy Asthma Immunol. 2022;128(3):314-318] Conclusie: Er is weinig bewijs. Er kan niet worden onderbouwd dat het risico op anafylaxie na toediening van röntgencontrastmiddelen bij patiënten met mastocytose hoger/anders is dan bij anderen. Röntgencontrastmiddelen zijn daarom niet gecontra-indiceerd bij patiënten met mastocytose.	6-12-2022	4-4-2023