

Dialyse peritoneaaldialyse: natriumfosfaat rectaal

8223

Clcr = creatinineklaring, GFR = glomerulaire filtratie snelheid

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Colex klysma 31,8 mg/ml / 139,1 mg/ml 28-10-2020.	Colex klysma is gecontraïndiceerd bij: matige en ernstige nierinsufficiëntie. Geen informatie over peritoneale dialyse.
Het Actue Boekje – Hyperfosfatemie update 1-7-2022 https://www.hetacuteboekje.nl/hoofdstuk/acute_water-_en_elektrolytstoornissen/hyperfosfatemie.html	Hyperfosfatemie oorzaken: • <i>Exogeen fosfaat</i>: intraveneuze/orale suppletie, fosfaatbevattende klysma's • <i>Verminderde renale excretie</i>: nierinsufficiëntie, hypoparathyreoïdie, vitamine D suppletie • ...

Opmerkingen:

- Werkgroep 21-5-2024: om het aantal signalen te beperken, eenmalige gift uitsluiten in de flow. Het risico lijkt bij eenmalige gift relatief klein.
- Werkgroep 31-5-2023: zowel bij verminderde nierfunctie als dialyse ook bewaken op rectale toediening. Waarschijnlijk is eenmalige toediening geen probleem, maar je wilt niet meermalig toedienen. Case reports zijn meestal het topje van de ijsberg, dus waarschijnlijk is er rationale om te bewaken (hoewel grootste studie geen verschil laat zien).
- Pubmed search 3-5-2023: geen resultaat

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	Ja	21 mei 2024