

Afkorting:

DRUID = Driving under the influence of Drugs, Alcohol and Medicines. (Europees gesubsidieerd onderzoeksproject naar de invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op de verkeersveiligheid).

Datum literatuursearch: 19-04-2023

CONCLUSIE

KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft faricimab ingedeeld in categorie 0 omdat er geen effect van faricimab op het centrale zenuwstelsel verwacht wordt.

OVERWEGINGEN

Er wordt geen effect van faricimab op het centraal zenuwstelsel verwacht en bij het opstellen van de verkeersdeelname adviezen wordt alleen rekening gehouden met de effecten op het centrale zenuwstelsel.

Faricimab wordt intravitreaal toegediend, de effecten op het zicht worden niet meegenomen in de bewaking omdat dit door een patiënt zelf te beoordelen is. Om deze reden en doordat het geneesmiddel waarschijnlijk de bloed-brein barrière niet passeert, is besloten om het geneesmiddel in te delen in categorie 0.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Onderzoeken specifiek gericht op verkeersdeelname zijn niet beschikbaar. Ook zijn geen laboratoriumtests uitgevoerd in de voor verkeersdeelname belangrijke domeinen.

Er is geen farmacologisch mechanisme waaruit blijkt dat faricimab invloed heeft op de rijvaardigheid. Faricimab neutraliseert angiotensine-2 (Ang-2) en VEGF-A. Door de neutralisatie vermindert faricimab de vasculaire permeabiliteit en ontsteking, remt de pathologische angiogenese en herstelt de vasculaire stabiliteit (IM mei 2023).

DRUID classificatiesysteem:

- category 0 (no or negligible influence on fitness to drive), [geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.]
- category I (minor influence on fitness to drive), [weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category II (moderate influence on fitness to drive), [matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]
- category III (severe influence on fitness to drive), [ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid.]

STUDIES

Bron	Bewijs	Resultaten/ opmerkingen
-	-	-

Classificaties

Bron	Resultaten/ opmerkingen
DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 4.4.1 (21-07-2011)	Dit geneesmiddel is niet beoordeeld door DRUID

SPC

Bron	Resultaten/ opmerkingen
SmPC Vabysmo 26-09-2022	4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Vabysmo heeft een geringe invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Tijdelijke visuele stoornissen kunnen optreden na de intravitreale injectie en het bijbehorende oogonderzoek. Patiënten mogen niet rijden of machines bedienen totdat de visuele functie voldoende is hersteld. 4.8 bijwerkingen Bij meer dan 10% van de patiënten: cataract. Bij 1-10%: conjunctivale bloeding, mouches volantes (bewegende vlekjes), verhoogde oogdruk, oogpijn, verhoogde traanproductie en bij natte LMD tevens retinale pigmentepitheelscheur. Bij minder dan 1%: oogirritatie, glasvochtbloeding, oculair ongemak, jeuk van het oog, schuring van het hoornvlies, oculaire hyperemie, wazig zien, iritis, uveïtis, iridocyclitis, vitritis, gevoel van een vreemd lichaam in het oog, endoftalmitis, netvliesscheur, conjunctivale hyperemie en afname gezichtsscherpte. Zelden regmatogene retinale loslating. Opmerking KNMP: De oculaire bijwerkingen kunnen ook worden veroorzaakt door de intravitreale injectie. Het afgenomen gezichtsvermogen wordt niet verder meegenomen in de beoordeling. Dit kan de patiënt namelijk zelf beoordelen.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing	Nee	Nee	0	09-03-2023