

Roxadustat + Lanthaancarbonaat	M 8260
--------------------------------	--------

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
SPC Evrenzo	roxadustat + lanthaancarbonaat	Roxadustat innemen ten minste 1 uur na fosfaatbinders (behalve lanthanum) of andere middelen die multivalente kationen bevatten. Gespreide toediening van fosfaatbinders (met tussenpozen van ten minste 1 uur) had geen klinisch significant effect op de blootstelling aan roxadustat bij patiënten met CNS.
Shibata T. J Clin Pharm Ther 2018;43:633-639. Roxa direct na ontbijt Ca: direct na ontbijt, lunch, diner	Roxadustat + lanthaancarbonaat	Geen significante verandering in AUC en C _{max} Roxadustat; geometric least squares mean ratio AUC 88%, en C _{max} 98.58%. Regime: gelijktijdige inname roxadustat 100 mg en lanthaancarbonaat 750 mg 3dd; studie met 18 vrijwilligers. Auteurs: The 90% CIs for both parameters were within the no-effect boundaries of 80% and 125%, indicating a lack of effect of lanthanum carbonate on roxadustat absorption.

Opmerkingen

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Nee	Nee	5 oktober 2023