

Maribavir + CYP3A4-inductoren	M8277
--------------------------------------	--------------

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC + EPAR Livtency	maribavir + rifampicine	↓ maribavir AUC met 60%, Cmin met 80%, Cmax met 40% Regime: rifampicine 600 mg 1dd en maribavir 400 mg 2dd; fase 1 studie met 15 patienten.	2A

Overig	Stof	Effect
SPC Livtency	maribavir + CYP3A4-inductoren	combinatie met de sterke CYP3A-inductoren (rifampicine, rifabutine of hypericum wordt niet aanbevolen) . Als combinatie met andere sterke of gematigde CYP3A-inductoren (bijv. carbamazepine, efavirenz, fenobarbital en fenytoïne) niet vermeden kan worden: verhoog dosis van maribavir naar 1200 mg 2dd Rifampicine: CYP3A4 en CYP1A2 inductie. EPAR: dose response studie not available.

Opmerkingen

Werkgroep Interacties & MFB's: standaardlijst CYP3A4-inductoren koppelen. Maribavir wordt vooral gemetaboliseerd door CYP3A4 (hoofdroute, ten minste 35%) en CYP1A2 (25%).

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Ja	5 oktober 2023