

Bariatrische chirurgie: Risperidon

RYGB, Roux-and-Y gastric bypass

CONCLUSIE

Er zijn onvoldoende gegevens over de toepassing van risperidon na bariatrische chirurgie. Na parenterale toediening wordt er geen effect van bariatrische chirurgie verwacht.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Onderbouwend	Bewijs	BMI / kg	Belangrijkste resultaten	Opmerkingen KNMP
-	-	-	-	-

Overig	BMI / kg	Belangrijkste resultaten	Opmerkingen KNMP
Brietzke E, Lafer B. Long-acting injectable risperidone in a bipolar patient submitted to bariatric surgery and intolerant to conventional mood stabilizers. Psychiatry Clin Neurosci. 2011 Mar;65(2):205. Case-report	BMI voor bariatrische chirurgie: 46	Resultaten: Een 43-jarige vrouw met een bipolaire stoornis type 2 werd iedere twee weken behandeld met een onderhoudsdosering risperidon intramusculair (i.m.) 25 mg, omdat orale medicatie niet werd verdragen. De vrouw had op 38-jarige leeftijd RYGB ondergaan. In het eerste jaar na start van risperidon i.m. zijn er geen episodes van hypomanie geweest.	Er is niet gekeken naar de invloed van RYGB op de farmacokinetiek van risperidon.
SmPC Okedi (14-02-2022)		Geen informatie over bariatrische chirurgie beschikbaar.	
SmPC Risperdal filmomhulde tabletten SmPC Risperdal drank SmPC Risperdal consta, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie mva		Geen informatie over bariatrische chirurgie beschikbaar.	

		Wijziging kinetiek	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Parenteraal	Onbekend	Nee	03-10-2023
Beslissing werkgroep	Oraal	Onbekend	Ja	03-10-2023