

Pemigatinib + H2-antagonisten	M 8430
-------------------------------	--------

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
--			

Overig	Stof	Effect
Ji T. Eur J Clin Pharmacol 2021;77:1887-97. + Correctie: Eur J Clin Pharmacol 2021;77:1899.	pemigatinib + ranitidine	↓Cmax met 2% en ↑AUC met 3% door ranitidine Regime: pemigatinib 13.5 mg 1x op dag 1 op lege maag, ranitidine 150 mg 2dd met voedsel op dag 3-5; vervolgens pemigatinib + ranitidine 1x met voedsel op dag 6; studie met 18 vrijwilligers. Auteurs: pemigatinib can be administered without regard to coadministration of H2 antagonists.
SPC + EPAR Pemazyre	pemigatinib + ranitidine	gelijktijdige toediening van ranitidine heeft niet geresulteerd in een klinisch belangrijke verandering in blootstelling aan pemigatinib.

Opmerkingen

Werkgroep Interacties Oncologische middelen: effect ranitidine is 'ruis' (↓met 2%), Nee/Nee.
GIC: SPC rept niet over pH-effect. Niets doen met antacida, effect onbekend.

Stockley, PubMed: niets.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Nee	Nee	2 oktober 2024