

Obesitas met BMI ≥ 40 kg/m²: ibandroninezuur

BMI, body mass index; PD, farmacodynamie; PK, farmacokinetiek

Conclusie

Er zijn geen gegevens bekend over de toepassing van ibandroninezuur bij patiënten met obesitas met BMI ≥ 40 kg/m².

	Wijziging PK/PD?	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	23-09-2024

Literatuur

Onderbouwend

Bron	BMI/kg	Resultaten	Opmerkingen
-			

Overig

Bron	BMI/kg	Resultaten	Opmerkingen
SmPC Bonviva (08-04-2024)*		Geen informatie over obesitas (met BMI ≥ 40 kg/m ²)	

* Hetzelfde geldt voor SmPC Bondronat (08-04-2024)

PICO

P(atient)	Patiënten met obesitas met BMI ≥ 40 kg/m ²
I(ntervention)	Ibandroninezuur
C(omparison / Control)	Patiënten zonder obesitas (BMI 18,5-25 kg/m ²)
O(utcome)	Farmacokinetische en farmacodynamische parameters

In- en exclusiecriteria

Inclusie:

- Voldoet aan PICO

Exclusie:

- Dierstudies
- In vitro studies

Zoektermen

Pubmed

Datum: 09-07-2024

Search #	Zoektermen
#1	(ibandronic acid) AND (obes* OR "extrem* obes*" OR "morbid* obes*" OR overweight* OR "overweight " [MeSH] OR "extremely overweight")

Embase

Datum: 09-07-2024

Search #	Zoektermen
#1	'ibandronic acid' AND (obes* OR 'obesity'/exp OR 'extreme obesity'/exp OR 'extrem* obes*' OR 'morbid obesity'/exp OR 'morbid* obes*' OR 'overweight'/exp OR overweight* OR 'extremely overweight')