

Obesitas met BMI ≥ 40 kg/m²: risedroninezuur

BMI = body mass index, PD = farmacodynamiek, PK = farmacokinetiek

Conclusie

Er zijn geen gegevens bekend over de toepassing van risedroninezuur bij patiënten met obesitas met BMI ≥ 40 kg/m².

	Wijziging PK/PD?	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Onbekend	Nee	23-9-2024

Literatuur

Onderbouwend

Bron	BMI/kg	Resultaten	Opmerkingen
-			

Overig

Bron	BMI/kg	Resultaten	Opmerkingen
SmPC Actonel (risedroninezuur) 4-1-2019		Geen informatie over obesitas.	

PICO

P(atient)	Patiënten met obesitas met BMI ≥ 40 kg/m ²
I(ntervention)	Risedroninezuur
C(omparison / Control)	Patiënten zonder obesitas (BMI 18,5-25 kg/m ²)
O(utcome)	Farmacokinetische en farmacodynamische parameters

In- en exclusiecriteria

Inclusie:

- Voldoet aan PICO

Exclusie:

- Dierstudies
- In vitro studies

Zoektermen

Pubmed

Datum: 20-8-2024

Search #	Zoektermen
#1	((risedronic acid) OR risedronate) AND (obes* OR "extrem* obes*" OR "morbid* obes*" OR overweight* OR "overweight"[MeSH] OR "extremely overweight")

Embase

Datum: 20-8-2024

Search #	Zoektermen
#1	('risedronic acid'/exp OR 'risedronic acid' OR 'risedronate'/exp OR risedronate) AND (obes* OR 'obesity'/exp OR 'extreme obesity'/exp OR 'extrem* obes*' OR 'morbid obesity'/exp OR 'morbid* obes*' OR 'overweight'/exp OR overweight* OR 'extremely overweight')