

# Bupropion + Encorafenib / Cenobamaat

M 8486

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Spc Braftovi	bupropion + encorafenib	↓ bupropion AUC&Cmax met ≤25% door 1-malig encorafenib; ↓AUC&Cmax met ≤ 26% en ↑AUC actieve metaboliet OH-bupropion 1.5x door herhaalde toediening encorafenib. Regime: cocktailstudie CYP-substraten (1-malig) + herhaalde doses encorafenib 450 mg 1dd (& binimetinib 45 mg 2dd), rosuvastatine 1- malig; melanoompatiënten.	2A
Greene SA. Clin Transl Sci. 2022;15:899- 911. Spc Ontozry	bupropion + cenobamaat	↓ bupropion AUC met 39% en Cmax met 23% Regime: cenobamaat 200 mg 1dd gelijktijdig met bupropion 150 mg; studie bij gezonde proefpersonen.	2A

Overig	Stof	Effect
Spc Braftovi	CYP2B6-substraten + encorafenib	effect op bupropion na herhaalde toediening wijst e inductie CYP2B6
Spc Ontozry	CYP2B6-substraten + cenobamaat	een verhoging van de dosis van CYP2B6-substraten, kan vereist zijn bij combinati met cenobamaat.

### Opmerkingen

GIC oktober 2025: zelf besloten + cenobamaat.

GIC november 2024: zelf besloten + encorafenib. De werkgroepen die interacties beoordelen hebben dit gedelegeerd → het GIC handelt zelf af indien toe- of afname substraat volgens eerdere besluiten duidelijk valt onder actie Ja of Nee, of als het effect te klein ('ruis' of niet significant of ↔) is."

Pubmed: -

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing GIC	Ja	Nee	-