

Rosuvastatine + Apalutamide	M 8487A
------------------------------------	----------------

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC Erleada	rosuvastatine + apalutamide	rosuvastatine (BRCP/OATP1B1): afname AUC met 41% Regime: apalutamide icm 'cocktail transporter-substraten' 1-malig	1-2A

Overig	Stof	Effect
SPC Erleada	substraten + apalutamide	werkzaamheid substraat kan afnemen, dosisaanpassing kan nodig zijn apalutamide is zwakke inductor van P-gp, BRCP/OATP1B1

Opmerkingen

Werkgroep Interacties Oncologische middelen 10-4-19: actie Nee voor apalutamide.

Pubmed: niets.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG OncolA	Ja	Nee	10 april 2019

Rosuvastatine + Relugolix

B

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Spc Orgovyx	rosuvastatine + relugolix	rosuvastatine ↓AUC met 27% en Cmax met 34%, wordt niet als klinisch betekenisvol beschouwd. Regime: rosuvastatine 10 mg 1x (BCRP-substraat) gelijktijdig met relugolix.	2A

Overig	Stof	Effect
Spc Orgovyx	rosuvastatine + relugolix	Er werden geen klinisch significante verschillen waargenomen in de farmacokinetiek van rosuvastatine. Relugolix remt BCRP in vitro. → GIC: dit verklaart niet de afname van rosuvastatine.

Opmerkingen
GIC november 2024: + relugolix. De werkgroepen die interacties beoordelen hebben dit gedelegeerd → het GIC handelt zelf af indien toe- of afname substraat volgens eerdere besluiten duidelijk valt onder actie Ja of Nee, of als het effect te klein ('ruis' of niet significant of ↔) is.

Pubmed feb 2024: -
Stockley on line feb 2024: nothing expected (relugolix).

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing GIC	Als A		