

Bempedoïnezuur + Probenecide	M 8547
------------------------------	--------

ESP15228: actieve metaboliet van bempedoïnezuur

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
Spc + EPAR Nilemdo	bempedoïnezuur + probenecide	↑AUC bempedoïnezuur 1.7x en AUC ESP15228 1.9x Regime: bempedoïnezuur 180 mg, probenecide 180 mg in steady-stateconcentratie, 20 subjects.	2A
Stockley online, feb 2024 (bron: UK and US manufacturers)	bempedoïnezuur + probenecide	info als SPC, plus info mbt Cmax en mbt actieve metaboliet: steady-state probenecid [dose not stated] increased the AUC and Cmax of bempedoic acid 180 mg 1.7x resp. 1.2x, and for the active metabolite of bempedoic acid 1.9x resp. 1.5x. These changes are not considered clinically relevant.	1-2A

Overig	Stof	Effect
Spc Nilemdo	bempedoïnezuur + probenecide	de verhoging is niet klinisch relevant en heeft geen invloed op het doseringsadvies. Probenecide remt glucuronideconjugatie. Stockley: nothing expected, no action.

Opmerkingen

Stockley: zie tabel.

PubMed: verder niets.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WG IA	Ja	Nee	2-6-2025